

# 令和8年度 定期予防接種について

★令和8年4月1日～RSウイルス(母子免疫ワクチン)の定期接種がはじまりました★



同じ種類のワクチンを受ける時は、下記の接種間隔で受けてください。

※ **生ワクチン** ⇨ **生ワクチン** を受ける場合のみ中27日以上

予防接種の種類	接種年齢	標準的な接種時期	回数	接種間隔
ロタウイルス 経口生ワクチン	生後6週～ (ワクチンの種類 によって終期が違 います。)	ロタリックス(1価): 1回目は、生後2ヶ月～14週6日ま で 以後は24週未満	2	1回目から4週間以上あけて2回目
		ロタテック(5価): 1回目は、生後2ヶ月～14週6日ま で 以後は32週未満	3	1回目から4週間以上空けて2回目 2回目から4週間以上空けて3回目
ヒブ(インフルエンザ菌b型) 不活化ワクチン	初回 2ヶ月～5歳未満 (開始月齢によっ て回数が違いま す。)	生後2ヶ月～7ヶ月未満	3	27日以上 (標準:27日～56日)
	追加 初回終了後7ヶ月以上～13ヶ月未満		1	初回終了後7ヶ月以上
小児用肺炎球菌 不活化ワクチン	初回 2ヶ月～5歳未満 (開始月齢によっ て回数が違いま す。)	生後2ヶ月～7ヶ月未満	3	27日以上
	追加 初回終了後60日以上あけ、1歳～1歳3ヶ月未満で		1	初回終了後60日以上あけて1歳以降 に
五種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風 ・不活化ポリオ・ヒブ)	1期初回 ①②③ 2ヶ月～ 7歳6ヶ月未満	生後2ヶ月～生後7ヶ月未満に開始し、20～56日の 間隔を置いて	3	20日以上の間隔を置いて (標準:20日～56日)
	1期追加	初回終了後6ヶ月～18ヶ月未満	1	初回終了後6ヶ月以上
四種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風 ・不活化ポリオ) 不活化ワクチン	1期初回 ①②③ 2ヶ月～ 7歳6ヶ月未満	生後2ヶ月～12ヶ月未満	3	20日以上 (標準:20日～56日)
	1期追加	初回終了後12ヶ月～18ヶ月未満	1	初回終了後6ヶ月以上
B型肝炎 不活化ワクチン	初回 ①② 2ヶ月～1歳未満	生後2ヶ月～8ヶ月未満	2	27日以上
	追加		1	初回から139日以上
BCG 生ワクチン	2ヶ月～1歳未満	生後5ヶ月～8ヶ月未満	1	
水痘(水ぼうそう) 生ワクチン	① 1～3歳未満	1歳～1歳3ヶ月未満	1	
	②	1回目接種後、6ヶ月～12ヶ月未満	1	3ヶ月以上
MR(麻しん・風しん) 生ワクチン	1期 1～2歳未満	1歳になったらすぐ	1	
	2期 小学校入学前の 1年間	小学校入学前の1年間	1	
日本脳炎 不活化ワクチン	1期初回 ①② 6ヶ月～ 7歳6ヶ月未満	3歳～4歳未満	2	6日以上 (標準:6日～28日)
	1期追加	4歳～5歳未満(初回終了後おおむね1年後)	1	初回終了後6ヶ月以上
	2期 9～13歳未満	9歳～10歳未満	1	
二種混合(ジフテリア・破傷風) 不活化ワクチン	2期 11～13歳未満	11歳～12歳未満	1	
ヒトパピローマウイルス (子宮頸がん予防) 不活化ワクチン	小学6年生(12歳 相当)～高校1年 生(16歳相当)の 女子	中学1年生の女子	3	1回目の接種日が… 15歳以上:2ヶ月あけて2回、1回目から 6ヶ月以上あけて1回 14歳まで:1回目から6ヶ月以上あけて1回
		シルガード(9価) 1回目から6ヶ月以上あけて1回		
RSウイルス (母子免疫ワクチン) 不活化ワクチン	妊婦	妊娠28週0日から36週6日までの妊婦		妊娠ごとに1回

## 【接種できる医療機関】

- 河合内科医院 722-3131
- 近藤クリニック 728-3233
- その他 県内協力医療機関

平成18年から平成19年4月1日生まれの方は20歳の誕生日の前日まで

## 日本脳炎特例措置

平成17～21年度は日本脳炎予防接種のご案内をしていません。  
 予防接種を受ける機会を逃した方へ接種機会の確保のため、  
 接種時20歳未満であれば不足回数分の予防接種を定期接種として  
 無料で受けることが出来ます。

接種スケジュール等のお問い合わせは、保健福祉課へ  
 【TEL:728-4411】

