


# 令和6年度 定期予防接種について

令和6年4月から5種混合ワクチンの接種が始まりました。

※ **生ワクチン** → **生ワクチン** を受ける場合のみ中27日  
 同じ種類のワクチンを受ける時は、下記の接種間隔で受けてください。



予防接種の種類	接種年齢	標準的な接種時期	回数	接種間隔
ロタウイルス <b>経口生ワクチン</b>	生後6週～ (ワクチンの種類によって 終期が違います。)	<b>ロタリックス</b> (1価) : 1回目は、生後2ヶ月～14週6日まで 以後は24週未満 <b>ロタテック</b> (5価) : 1回目は、生後2ヶ月～14週6日まで 以後は32週未満	2 3	1回目から4週間以上あけて2回目 1回目から4週間以上空けて2回目 2回目から4週間以上空けて3回目
ヒブ(インフルエンザ菌b型) <b>不活化ワクチン</b>	初回 追加	2ヶ月～5歳未満 (開始月齢によって 回数が違います。)	3 1	27日以上 (標準:27日～56日) 初回終了後7ヶ月以上
小児用肺炎球菌 <b>不活化ワクチン</b>	初回 追加	2ヶ月～5歳未満 (開始月齢によって 回数が違います。)	3 1	27日以上 初回終了後60日以上あけ、1歳～1歳3ヶ月未満で 初回終了後60日以上あけて1歳以降に
五種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風 ・不活化ポリオ・ヒブ)	1期初回 ①②③ 1期追加	2ヶ月～ 7歳6ヶ月未満	3 1	20日以上の間隔を置いて (標準:20日～56日) 初回終了後6ヶ月以上
四種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風 ・不活化ポリオ) <b>不活化ワクチン</b>	1期初回 ①②③ 1期追加	2ヶ月～ 7歳6ヶ月未満	3 1	20日以上 (標準:20日～56日) 初回終了後6ヶ月以上
B型肝炎 <b>不活化ワクチン</b>	初回 ①② 追加	2ヶ月～1歳未満	2 1	27日以上 初回から139日以上
BCG <b>生ワクチン</b>	2ヶ月～1歳未満	生後5ヶ月～8ヶ月未満	1	
水痘(水ぼうそう) <b>生ワクチン</b>	① ②	1～3歳未満	1 1	1歳～1歳3ヶ月未満 1回目接種後、6ヶ月～12ヶ月未満 3ヶ月以上
MR(麻しん・風しん) <b>生ワクチン</b>	1期 2期	1～2歳未満 小学校入学前の 1年間	1 1	1歳になったらすぐ 小学校入学前の1年間
日本脳炎 <b>不活化ワクチン</b>	1期初回 ①② 1期追加 2期	6ヶ月～ 7歳6ヶ月未満 9～13歳未満	2 1 1	6日以上 (標準:6日～28日) 初回終了後6ヶ月以上 9歳～10歳未満
二種混合(ジフテリア・破傷風) <b>不活化ワクチン</b>	2期	11～13歳未満	1	11歳～12歳未満
ヒトパピローマウイルス (子宮頸がん予防) <b>不活化ワクチン</b>		小学6年生(12歳 相当)～高校1年 生(16歳相当)の 女子 ※キャッチアップ対 象者含む(個別通 知予定)	3	中学1年生の女子 <b>サーバリックス</b> (2価) : 1ヶ月あけて2回 1回目から6ヶ月以上あけて1回 <b>ガーダシル</b> (4価) : 2ヶ月あけて2回、1回目から6ヶ月以 上あけて1回 <b>シルガード</b> (9価) : 1回目から6ヶ月以上あけて1回 1ヶ月以上あけて2回、1回目から5ヶ月以上 かつ2回目から2ヶ月半以上あけて1回 1ヶ月以上あけて2回、2回目から3ヶ月以上 あけて1回 1回目の接種日が… 14歳まで:1回目から6ヶ月以上あけて1回 15歳以上:2ヶ月あけて2回、1回目から6ヶ月 以上あけて1回

## 【接種できる医療機関】

- 河合内科医院 722-3131
- 近藤クリニック 728-3233
- その他 県内協力医療機関

## 平成16年度から平成18年度生まれの方の 日本脳炎予防接種について

平成17～21年度は日本脳炎予防接種のご案内をしていませ  
 せん。  
 予防接種を受ける機会を逃した方への接種機会の確保のため、  
 接種時20歳未満であれば不足回数分の予防接種を定期接種  
 として無料で受けることが出来ます。

接種スケジュール等のお問い合わせは、保健師へ  
 【TEL: 728-2047】

